

Analgetika ve formě gelu nebo krému

NATŘETE TO BOLESTI



Ibalgin® KRÉM

OD
12 LET

ZÁDA

SVALY

KLOUBY

Léčivá látka ibuprofen působí protizánětlivě, v postiženém místě snižuje otok a potlačuje bolest. Používá se k léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků, jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění.

Bez parfemace.

Není známo riziko fototoxické reakce (nežádoucí kožní účinky po vystavení ošetřeného místa slunečnímu záření).

Těhotenství: použití pouze v 1. a 2. trimestru – na doporučení lékaře.

Kojení: použití na doporučení lékaře, pouze krátkodobě a na malé plochy.

Pro dospělé (včetně starších pacientů) a dospívající od 12 let:

Na postižené místo vetřete 4–10 cm dlouhý proužek krému, 3–4x denně. Interval mezi jednotlivými aplikacemi 3–4 hodiny. Po aplikaci na kůži se ibuprofen dobře vstřebává do podkožních tkání.

Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech lze ošetřené místo na počátku léčby překrýt neprodyšným obvazem.

Velikosti balení: 50 g, 100 g

MASTNĚJŠÍ
KRÉMOVÝ
ZÁKLAD



Ibalgin® krém je lék k vnějšímu užití. Obsahuje ibuprofen.

Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Ibalgin® GEL

OD
12 LET

SVALY

KLOUBY

Léčivá látka ibuprofen působí protizánětlivě, v postiženém místě snižuje otok a potlačuje bolest. Používá se k léčbě zánětu šlach, svalů a při úrazech, jako jsou otoky, zhmoždění, podvrtnutí kloubu.

Bez parfemace.

Není známo riziko fototoxické reakce (nežádoucí kožní účinky po vystavení ošetřeného místa slunečnímu záření).

Těhotenství: použití pouze v 1. a 2. trimestru – na doporučení lékaře.

Kojení: použití na doporučení lékaře, pouze krátkodobě a na malé plochy.

Pro dospělé a dospívající od 12 let:

Na postižené místo vetřete 4–10 cm dlouhý proužek gelu, 3–4x denně. Interval mezi jednotlivými aplikacemi 3–4 hodiny. Po aplikaci na kůži se ibuprofen dobře vstřebává do podkožních tkání.

Velikosti balení: 50 g, 100 g

ČIRÝ
GELOVÝ
ZÁKLAD



Ibalgin® gel je lék k vnějšímu užití. Obsahuje ibuprofen.

Pozorně čtěte příbalovou informaci a poradte se s lékařem nebo lékárníkem.

Ibalgin® DUO EFFECT

OD
12 LET

SVALY

KLOUBY

ZÁDA

KREVNÍ PODLITINY

OTOKY

Obsahuje 2 léčivé látky:

- **ibuprofen** působí protizánětlivě, potlačuje bolest, zmírňuje otok,
- **heparinoid S** zabraňuje tvorbě krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, snižuje tvorbu otoků a působí protizánětlivě.

Použití k úlevě od bolesti zad a k léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů, např.:

- otoky a krevní podlitiny,
- podvrtnutí kloubu,
- poranění měkkých částí kloubů.

Bez parfemace.

Není známo riziko fototoxicke reakce (nežádoucí kožní účinky po vystavení ošetřeného místa slunečnímu záření).

Pro dospělé a dospívající od 12 let:

Na postižené místo větřete 2–3x denně v časových odstupech 4–5 hodin asi 1 mm silnou vrstvu krému. Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech lze na počátku léčby překrýt ošetřené místo neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc.

Velikost balení: 50 g, 100 g



Ibalgin® Duo Effect je lék k vnějšímu užití.

Pozorně čtěte příbalovou informaci a poradte se s lékařem nebo lékárníkem.

Inflamalgin®

10 mg/1 g gel

OD
14 LET

SVALY

KLOUBY

ZÁDA

ARTRÓZY PERIFERNÍCH KLOUBŮ, TENISOVÝ LOKET*

Obsahuje léčivou látku diklofenak, která stejně jako ibuprofen patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv.

Používá se k léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý nebo degenerativní původ.

- Odstranění bolesti a zánětu kloubů.
- Úleva od bolesti při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolenc (na doporučení lékaře).
- Léčba lokalizované formy revmatismu měkkých tkání, např. tenisového lokte (na doporučení lékaře).

Bez parfemace.

Pro dospělé a dospívající od 14 let:

Na postižené místo větřete malé množství gelu (obvykle dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu) 3–4x denně.

Velikost balení: 100 g



Inflamalgin® 10 mg/1 g gel je lék k vnějšímu užití.

Obsahuje diclofenacum sodium.

Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraděte se s lékařem nebo lékárníkem.

* na doporučení lékaře